

PER APPROFONDIRE

- www.ass3.sanita.fvg
www.salute.gov.it
www.vaccinarsi.org
www.agenziafarmaco.gov.it
www.cdc.gov
www.who.int
www.epicentro.iss.it

CONTATTI UTILI

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Dott. Andrea Iob
andrea.iob@ass3.sanita.fvg.it tel. 0432 989500

DIRETTORI PEDIATRIA

Dott. Bruno Sacher (San Daniele)
bruno.sacher@ass3.sanita.fvg.it tel. 0432 949278

Dott. Tiziano Basso (Tolmezzo)
tiziano.basso@ass3.sanita.fvg.it tel. 0433 488314

APPUNTAMENTI VACCINALI RACCOMANDATI PER I MINORI - CON CHIAMATA ATTIVA E GRATUITA

Vaccino	3° mese	5° mese	7° mese	9° mese	13° mese	14° mese	15° mese	5-6 anni	12-18 anni
Difterite Tetano Pertosse	1* Dose	2* Dose			Richiamo			Richiamo	Richiamo
Anti- poliomielite	1* Dose	2* Dose			Richiamo			Richiamo	Richiamo
Epatite B	1* Dose	2* Dose			Richiamo				
Haemophilus influenzae b	1* Dose	2* Dose			Richiamo				
Morbillo Rosolia Parotite Varicella						1* Dose		2* Dose	
Pneumococco C	1* Dose	2* Dose				Richiamo			
Meningococco B			1* Dose						1* Dose
Meningococco C									
Papilloma virus (HPV)				2* Dose			Richiamo		Ciclo a due dosi



CAMPAGNA INFORMATIVA SULLE
 VACCINAZIONI PEDIATRICHE



LE MALATTIE EVITABILI GRAZIE AI VACCINI


La domanda che ci dovremmo porre al giorno d'oggi quando diventiamo genitori e dobbiamo vaccinare i nostri figli è: **sappiamo davvero quali rischi corrono se non li vacciniamo?** Fino a qualche decennio fa malattie come il vaiolo o la poliomielite erano un rischio concreto e reale durante tutto l'arco della vita. Grazie alle straordinarie campagne vaccinali messe in pratica in passato, queste (e altre) malattie **erano diventate solo un brutto ricordo**. Paradossalmente quindi l'efficacia dei vaccini ha fatto sì che ora la loro importanza sia **gravemente sottovalutata**.

COMPLICAZIONI DELLE MALATTIE	
MORBILLO	PAROTITE
OSPEDALIZZAZIONE 18 bambini su 100	ORCHITE 20-50 bambini su 100
POLMONITE 6 bambini su 100	INTERESSAMENTO DEL SISTEMA NERVOSO 15 bambini su 100
ENCEFALITE 1 bambino su 1000	PANCREATITE 2-5 bambini su 100
MORTE 2 bambini su 1000	MORTE 1-3 bambini su 10 mila

Per quanto riguarda le malattie più gravi (come ad esempio la poliomielite o la meningite) tutti sanno quali sono le complicanze possibili quando vengono contratte, ma per quanto riguarda soprattutto le malattie per cui si vaccina il bambino nel secondo anno di vita **spesso si tende a sottovalutare gli effetti che esse possono avere**. Il morbillo ad esempio può causare l'ospedalizzazione a 18 bambini su 100, la polmonite a 6 bambini su 100, l'encefalite a 1 bambino su 1000 e la morte a 2 bambini su 1000. Per approfondire i rischi delle singole malattie potete visitare la sezione dedicata sul sito www.ass3.sanita.fvg.it

IL WEB E LA DISINFORMAZIONE: FIDATEVI DI NOI!

Negli ultimi anni *internet* è diventato un importantissimo mezzo di comunicazione e di scambio. Essendo però di facile accesso **chiunque può riportare o inventare studi fintamente scientifici** e trarre in inganno chi ricerca informazioni. Questo è proprio il caso dei vaccini: da diversi anni infatti si è diffusa la falsa credenza che ci possa essere una correlazione tra alcuni vaccini e lo sviluppo dell'autismo o di malattie autoimmuni. Vi è evidenza scientifica che **questa corrispondenza non esiste**.



Effetto gregge efficace: tutti sono protetti

Diffusione della malattia per scarsa copertura

Non proteggere i nostri figli significa **mettere a rischio l'intera comunità**, anche i figli dei nostri amici, i nostri parenti o i nostri vicini di casa. Utilizzando la metafora del gregge, in un gruppo dove tutti sono vaccinati, anche gli individui più piccoli, più fragili o più deboli sono al sicuro. **È per questo motivo che vi consigliamo di vaccinare i vostri bambini.**



In queste tabelle riportiamo gli **UNICI effetti collaterali** che potrebbero insorgere dopo i vaccini previsti nei primi due anni di vita del bambino.

Vaccinazioni primo anno di vita Copertura per: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, meningococchi, pneumococchi, Haemophilus influenzae b	
UNICI EFFETTI COLLATERALI	
FEBBRE	Probabilità tra 5 e 10% dei casi. Solitamente lieve e di breve durata
IRRITABILITÀ	Nel 30-40% dei casi, nelle ore seguenti, il bimbo è capriccioso o disturbato nelle proprie attività quotidiane
PIANTO	Associato al dolore o all'irritabilità. In casi rari (1 su 1000) il pianto può essere insistente e di lunga durata
SONNOLEZZA	Nel 10-20% dei casi
REAZIONI LOCALI	Nel 5-10% dei casi. Si risolve spontaneamente nel giro di qualche giorno
REAZIONI ALLERGICHE A COMPONENTI DEL VACCINO	Rarissime (1 caso ogni diverse centinaia di migliaia di dosi)

Vaccinazioni secondo anno di vita Copertura per: morbillo, rosolia, parotite, varicella	
UNICI EFFETTI COLLATERALI	
FEBBRE ED ERUZIONE CUTANEA (5-12 gg. dopo il vaccino)	Probabilità tra 5 e 10% dei casi. Solitamente lieve e di breve durata
CONVULSIONI	Raro (1 su 10.000 dosi). Dipende dalla febbre
TROMBOCITOPENIA (un mese dopo il vaccino)	Probabilità di 1 caso su 30.000
FEBBRE E GONFIORE AI LINFONODI DEL COLLO (6-10 gg. dopo il vaccino)	Probabilità di 1 caso su 7
DOLORI ALLE ARTICOLAZIONI	1 bambino su 200